

Odlararbrev v. 32

- Aktuellt i fält
- Insektsbevakning
- Bladmögelprognos
- Alternaria
- Bevattnings
- Semester

Aktuellt i fält

Det är fortfarande övervägande torrt i vårt odlingsområde, även om det lokalt har förekommit en del nederbörd. Bladmögeltrycket är fortsatt generellt lågt enligt Skimmelstyring. Vi har noterat en ny mindre inflygningstopp av stritar på några platser.



Insektsbevakning

En mindre inflygningstopp av stritar har noterats på några platser. I våra klisterfällor har toppen passerats i Gärds Köpinge, Norra Åsum, Östra Ljungby och Nymö. I dessa områden är det nu aktuellt att behandla.

Fält som ska skördas i samband med kampanjstart kan avstå behandling.

► Bekämpningsrekommendation: Mospilan SG 0,25 kg/ha

För att hitta närmsta lokala stritfälla använd nedanstående länk till Jordbruksverkets "Skadegörare på karta".

<https://etjanst.sjv.se/povpub-gui/#!/karta?produktionsinriktning=jordbruk>

Bladlusförekomsten är fortsatt låg och endast enstaka fynd har gjorts.

Bladmögelprognos

Det generella bladmögeltrycket är fortsatt lågt enligt Skimmelstyring. Huvudrekommendationen är därför behandling med 50 % dos, med hänsyn till lokala variationer.

Denna veckas preparatval är Shirlan/Banjo/Signal/Vamos + Leimay/Shinkon

Bekämpningsrekommendation:			
Vecka 32	Full dos	75 % dos	50 % dos
Shirlan/Banjo/Zignal/Vamos			0,2 l
Leimay/Shinkon			0,25 l

Kommande vecka (33) är Revus top+Amistar/Mirador planerat.

Alternaria (torrfläcksjuka)

Räkna med att en behandling mot alternaria (torrfläcksjuka) varar ca två veckor. Behandlades fälten förra veckan är det inte aktuellt förrän kommande vecka (33). Kommande vecka (33) är difenokonazol (Revus top el. Narita) tillsammans med azoxistrobin (Amistar el. Mirador) planerat.

Bevattning

Prioritera om möjligt bevattningen under den kommande perioden. Lyckeby's treåriga bevattningsförsök visar att stärkelsepotatis har en god skörderespons på bevattning. Fältförsöken som genomfördes åren 2022-2024 på lätt jord utgick från ett scenario där totalt 100 mm bevattningsvatten fanns tillgängligt. Resultaten visar att bevattning under juli och augusti ger stor effekt på både knölskörd och stärkelsehalt, eftersom det är då knölarna växer som mest och lagrar in stärkelse. **I medeltal för fyra olika sorter ökade knölskörderna med cirka 140 kg/ha per tillförd millimeter.**

Semester

Under de kommande veckorna har vi semester enligt tabellen nedan. Odlarbreven fortsätter att komma varje måndag under hela sommaren.

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
32	1 tjänst	1 tjänst	Semester	Semester	Semester

Hälsningar

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65
Nils Pihl Mattsson (sommarjobbare)
Nils.PihlMattson@lyckeby.com
044-28 61 37

Länk till Skimmelstyring: [PoV Pub 4.0](#)

Mer info kring årets behandlingsprogram finns på starkelse.se

SKIMMELSTYRING		Rekomenderad dos för vecka 32	
Väderstation		03-aug	
Boarp GRID	50%	Mosslunda	50%
Borgeby	50%	Mörbylånga /Resmo GRID	50%
Bräkne-Hoby GRID	50%	Nymö	50%
Brönnestad	50%	Näsum/Vånga GRID	50%
Glemmingebro GRID	50%	Oderup GRID	50%
Helgegården	50%	Ramdala GRID	50%
Hviderup	50%	Sandby gård	50%
Hässleholm GRID	50%	Skarhult GRID	50%
Höllviken GRID	50%	Skivarp GRID	50%
Hönedal GRID	50%	Svedala GRID	50%
Hörte GRID	50%	Teckomatorp GRID	50%
Kalmar /Halltorp GRID	50%	Tollarp GRID	50%
Karlshamn GRID	50%	Tomelilla GRID	50%
Kastlösa	50%	Torekov 1	50%
Klippan GRID	50%	Torslunda	50%
Knislinge GRID	50%	Trolle Ljungby GRID	50%
Laholm GRID	50%	Vassmolösa	50%
Lilla Böslid	50%	Vellinge	50%
Lister	50%	Vittskövle	50%
Lund/Silvåkra GRID	50%	Vä GRID	50%
Löddeköpinge GRID	50%	Åhus GRID	50%
Löberöd GRID	50%	Önnestad GRID	50%
Mellby	50%		
Rekomenderad dos 50%			
Rekomenderad dos 75%			
Rekomenderad dos 100%			